

ડૉ. અપૂર્વ કાળજી રોગી ના નિષ્ણાત સર્જન

MS, FRCS MCh (gold Medalist) DNB (CVTS)

હદ્ય ધમની અને છાતી ના રોગો ના નિષ્ણાત સર્જન

ઓપોલો હોસ્પિટલ ભાર ગામ અમદાવાદ, લાઈફ કેર હોસ્પિટલ સરદાર ચાર રસ્તા અમદાવાદ

શેલ્બિ હોસ્પિટલ, કણ્ણાવતી કલબ સામે, એસ.જી. હાઇ-વે, અમદાવાદ

એસ.એ એલ હોસ્પિટલ ફ્રાઇવ-ઈન રોડ, અમદાવાદ ૫૪ કિલોમીટર ઈન્સ્ટિટ્યુટ, બોપલ અમદાવાદ

કિલોમીટર: (૧) ૩૧૦,(B) લાઈફ, ફ્રાઇવ-ઈન રોડ, અમદાવાદ ૫૪,

(૨) લાઈફ કેર હોસ્પિટલ સરદાર ચાર રસ્તા અમદાવાદ ૯

કોન: ૮૮૦૮૮૦૫ ૦૫ ૫, (દર) ૦૭૯-૨૬૮૮૦૪૦૨ કિલોમીટર: ૦૭૯-૬૪૫ ૦૫ ૮૮૮ મોબાઇલ ૮૮૨૫ ૦૦૫ ૮૮૮

(હદ્ય ના ઓપરેશન બાદ ઉપયોગી કેટલાક જરૂરી સુચના)

૧ હોસ્પિટલના સુરક્ષિત વાતાવરણમાંથી ઘરે જઈ બધું જ બરાબર થતા બે-ચાર દિવસો લાગશે.

૨ ઘરે ગયા બાદ દિવસો આરામ કરવો, (ખાસ કરીને જ્યાં બાદ કે લાબું ચાલ્યા બાદ.) આરામ નો સમય તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે ગોઠવવો.

૩ કેટલાક દિવસો સારા જરૂરી તો કેટલાક ઠિકઠીક. રોજરોજની પ્રગતિ પર ધ્યાન આપવાને બદલે અઠવાડિયે કેટલી પ્રગતિ ચાય છે એના ઉપર ધ્યાન આપવું કારણ કે સાજ થવાની પ્રક્રિયા ધીમી હોય છે.

૪ કયારેક કંટાળો કે ડિપ્રેશન આવી જાય તો મુંઝાવું નહીં, કારણકે તે સામાન્ય છે. કમે કમે સુધારો થશે.

૫ અગાઉની જેમ ઊંઘ આવતાં સમય લાગશે, તો ગાભરાવું નહીં, આવું કયારેક બને છે. દિવસ દરમિયાન ઊંઘવાનું ટાળવું.

૬ ટંકા કાઢાય પછી બે દિવસ રહીને સાબુ ઘરીને નહાઈ લેવું. નહાવા માટે કોઈપણ સાબુ ચાટે પાચ દવા વાળો સાબુ હોય જેમકે ડેટોલ કે સેવલોન સાબુ એ વધારે સારુ રહેશે. બરાબર નાણી લીધા પછી કાપા ઉપર કોપરાવું તેલ લગાવી લેવું. આ પ્રક્રિયા જ્યાં સુધી બરાબર રહુન આવી જાય ત્યાં સુધી નિયમીત કરવી.

૭ તમારા કેટલાક દિવસ સારા તો કેટલાક માઠા જરૂરી અને આવતા ચારેક અઠવાડિયા તમારી ભૂખ અને એકાગ્રતામાં સુધારો થશે.

કયારેક શાસ લેવામાં ગાભરામણ અનુભવાશે, તે વખતે તમે જે કામ કરતા હો તે બંધ કરી ઊડા શાસ લેવા.

૮ જો તમારા પગની નસ બાયપાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હોય તો તો સાંજના સમયે પગમાં સૌજા આવવા સામાન્ય છે. થોડા

અઠવાડિયા પછી આ તકલીફ દૂર થઈ જશે. જો તમારે લાંબા સમય સુધી બેસવાનો પ્રસંગ થાય તો પગને સ્ટુલ કે

ટીપોય પર ઉચ્ચા રાખવા અને પ-૧૦ મિનીટ ઉપર નીચે કરવા.

૯ જો તમારી હાથની નસ બાયપાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હોય તો તો જગ્યાએ અને હાથનાં પંજા ઉપર ખાલી ચડી હોય એવું લાગશે. તમે નાના રબર બોલનો ઉપયોગ કરી આંગળીયોની કસરત ચાલુ રાખશો.

૧૦ જો તમને પગો લાંબા મોજ પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવી હોય તો તમારે ચારેક અઠવાડિયા સુધી દિવસે પહેરી રાખવા અને રાત્રે સુધી વખતે કાઢી નાખવા.

૧૧ છાતીમાં, ખલે અને વાંસામાં બે ખલાનાં વચ્ચે દંડ થાય તે રવાભાવિક છે. આઠથી દસ અઠવાડિયામાં કમે કમે તે જતું રહેશે. છાતી

કરતા પગમાં થયેલા ઘા કયારેક વધારે પીડાદાયી હોય છે. જે સામાન્ય છે. તે વખતે પેરેસીટેયોલ ની ૫૦૦ મિ.ગ્રા. પાવરની

ગોળીયો લેવી. આ ગોળીયો જરૂર જણાય તો દિવસમાં છ ગોળી સુધી લઈ શકાય છે, જરૂરત જણાય તો જ.

૧૨ છાતી કે પગના ઘા માંથી કયારેક પાણી જવું કે લોહી જવું પ્રવાહી નીકળે તો ગાભરાવું નહીં. આ સામાન્ય છે અને તેના માટે કોઈ સારવાર ની જરૂર નથી. પણ વધારે દિવસ સુધી પ્રવાહી નીકળે અન્યથા તાવ આવે તો ડોકટર ની પારો જવું અને તપાસ કરવાની.

૧૩ છ અઠવાડિયા સુધીના સમય દરમાન છીંક ખાતી વખતે છાતી પર ઓશીકું મૂકીને કે હાથ મૂકીને છાતી પકડી રાખવી.

૧૪ તમારા ડોકટરની સલાહ -સૂચન અનુસાર સવારે કે સાંજે પંદર મિનીટ ચાલવાનું રાખો અને ધીમે ધીમે ચારથી છ અઠવાડિયા દિવસમાં બે વાર કલાક કલાક સુધી ચાલવાનું રાખો. ચાલવાનો આધાર તમારા પર છે. એટલું યાદ રાખો કે ચાલવું ફરજિયાતાં.

ધીમે ધીમે અને નિયમિત રીતે સંજોરીનો હેતુ બે થી ચાર મહીનામાં તમને સામાન્ય જીવન તરફ લઈ જવાનો છે.

૧૫ બાર અઠવાડિયા સુધી કોઈ ભારે વજનવાળી વસ્તુને જાંચકી નહીં કે જોરથી ઘકકો મારવો નહીં કે જોરથી ખેંચવું નહીં અને નીચે નમવું નહીં. આથી છાતીનાં હાડકાણું જોડાણ સરળ બનશે.

- ૧૬ છ એક અઠવાડિયા પણી હળવી રમતો અને જાતીય જીવન શરૂ કરી શકો છો. ભારે રમતો બાર અઠવાડિયા સુધી રમવી નહીં.
- ૧૭ તમારા ડૉક્ટરની સલાહ વગર વાહન ન ચલાવવા.. બની શકે ત્યાં સુધી સ્કુટર-કે બાઈક પાઇલ બેસવું નહીં. તે કયારે શરૂ કરવું તે માટે ડૉક્ટર જ સલાહ આપશે. સામાન્ય રીતે લગભગ દસ-બાર અઠવાડિયા બાદ પરવાનગી શક્ય છે.
- ૧૮ જો દાર પીવાની આદત હોય તો ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે લઈ શકો છો. જો ટેવ જ ન હોય તો લેવાની કે શરૂ કરવાની જરૂર નથી.
- ૧૯ ધૂમપાન કે તમારું કોઈપણ રીતે લેવા નીષેધ છે. આનાથી નજીઓ બંધ થવાની શક્યતા વધે છે.
- ૨૦ ઓપરેશનના એક મહીના સુધી ઈંચ, તેથી વસ્તુ ખલાય. આ છૂટ તમારી શક્કિત મેળવવા માટે અપાઈ છે એક મહીના પણી વિકાશ વાળી વસ્તુ ખાસ કરીને ઈંચ કરી દેવું. માંસાખરી લોકોને મરધી-માછળી પ્રમાણ સર ખાવાની છૂટ છે. (ઓછા તેલમાં બનાવેલ હોય તો પણ આ ખોરાક ઓછી માત્રામાં જ લેવો.)
- ૨૧ બાયપાસ સર્જેરી પણી એસ્પીરીનની ગોળીઓ આખી જુંગાં પણેત ચાલુ રાખવીજરી છે..
- આ ગોળીઓથી બાયપાસ માટે મૂકેલી નળી લાંબા સમય સુધી ખુલ્લી રહે છે.
- ૨૨ વ્યવસાયઃ છ થી આઠ અઠવાડિયા પણી જઈ શકશો થાક ન લાગે તેવો વ્યવસાય કરવો. ૩ મહિના બાદ તમે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ ભારે વ્યવસાય કે નોકરી કરી શકોશો.
- ૨૩ તમને લખેલી દવા બજારમાં ન મળેતો તમારા ડૉક્ટરને પૂછીને બીજી દવા લાખાવવી. દવા નિયમ મુજબ લેવી અને ડૉક્ટર કહે ત્યારે જ બંધ કરવી. એ સિવાય બંધ કરવી નહીં.
- ૨૪ ચેકઅપ માટે ફરીથી ડૉક્ટર પાસે જાઓ ત્યારે પૂછવાના પ્રશ્નોની યાદી તૈયાર કરીને જરૂર. જેથી અગત્યની વાત ભૂતી જવાય નહીં. લખેલી દવાઓની યાદી પણ લઈ જવી. તમારી આખી ફાઈલ સાથે રાખવી.
- ૨૫ કયારેય પણ સમસ્યા બેબી થાય તો પ્રથમ તમારા કાડિયોલોજિસ્ટ (હદ્ય રોગ નિષ્ણાત) નો સંપર્ક સાધવો. જો તેઓ ન મળે તો ઉપરોક્ત ફોન નંબર પર ફોન કરવો અથવા સીધા આની જરૂર.

વાલ્વ સર્જેરીવાળા દર્દીઓ માટે ખાસ સૂચના

- ૧ વાલ્વ સર્જેરીવાળા દર્દીઓ માટે વારફેરીન અથવા એસીટ્રોમની ગોળી લેવી જરૂરી છે. આ ગોળી વાલ્વ પર લોહી જમી જતૂ અટકાવે છે અને વાલ્વ ને ખુલ્લો રાખે છે.
- ૨ જો તમે વારફેરીન કે એસીટ્રોમ લેતા હોવ તો તમારો પ્રોથોમ્બીન ટાઈમ (PT Test) ટેસ્ટ ૬૨ પંદર દિવસે કરાવવો. તમારા ઓપરેશન પણી ૧૫-૧૫ દિવસના અંતરે આ ટેસ્ટ કરાવવો. આ એક મહિના સુધી કરવું. એ પણી મહિને-મહિને પી.ટી ટેસ્ટ કરાવવો. આ ૩ મહિના સુધી કરવું. એ પણી ૬૨ ૩ મહિને આ ટેસ્ટ કરાવવો. જરૂરીયાત પ્રમાણે આ ટેસ્ટ કરાવવો પણ તમારો આઈ.એન.આર ૨.૦ થી ૨.૫ ની વચ્ચે હોવો જોઈએ.
- ૩ વારફેરીન કે એસીટ્રોમ વગેરેની ગોળી ખાતી પેટ લેવી. ગોળી લો એના પહેલા અને પણી ના બે કલાક કશું પણ ન લેવું.
- ૪ દર્દીને કયારેય કોઈપણ ઈન્જેક્શન લાગે દા.ત. શરદી, તાવ થાય તો તત જ ડૉક્ટર પાસે જરૂર અને દવા કરાવી.
- ૫ આ દવા તે દરમાન તમને કયારે પણ કોઈ ઈજ થશે તો તમારું લોહી વધારે વઢેશે. આવું થાય તો ગભરાવવાની બિલકૂલ જરૂર નથી. જે જ્યાએ ઈજ પહોંચી હોય તે જ્યાને ૧૫ મિનીટ સુધી ચોખા કપડા વડે દબાવી રાખવું, જરૂર પડે તો તુરત હોસ્પિટલમાં પહોંચી જરૂર.
- ૬ દર્દીએ જમવામાં ઝાંચા શાકભાજ (સલાદ) અને લીલી ભાજ વગેરે પ્રમાણાસર લેવા.
- ૭ દર્દીએ મીઠું પ્રમાણમાં ઓછું લેવું. વાલ્વ ના દર્દી ને ચિકાશવાળી વસ્તુની કોઈ પહેંજ નથી.
- ૮ ટામેટા પ્રમાણ મા જ લેવા જોઈએ- કેમકે તે વારફેરીન/ એસીટ્રોમ ની અસર ઓછી કરે છે.
- ૯ કોઈપણ પ્રકારનું નાનું કે મોટું ઓપરેશન કરવાનું હોય તો ઓપરેશન કરનાર ડૉક્ટરને તમે લેતા વારફેરીન/એસીટ્રોમ દવાની જાણ કરવી અને જરૂર પડે તો દવા બંધ કરીને તની જ્યાએ હેપરીન ઈન્જેક્શન શરૂ કરીને ઓપરેશન કરી શકાય આ માટે તમારાભાટેસર્જનનો સંપર્ક સાધવો.
- ૧૦ તમારી સાથે હુમશા તમારું ઓળખપત્ર રાખવું અને તેમાં અવશ્ય નોંધ કરવી કે તમારી સર્જેરી થયેલ છે અને તમે વારફેરીન અથવા એસીટ્રોમ નામની દવા લો છો.

સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવન ની અનેક શુભેચ્છાઓ સાથે.....